

不整脈非薬物治療ガイドライン（2018 年改訂版）
初版～2021/4/16 更新版 正誤表

記載に誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正致します。
(2021.9.6)

訂正箇所	誤	正
p30 図 4「冠動脈疾患に対する ICD 適応」一番右の推奨クラス	クラス IIa	クラス I
p31 図 5 タイトル	心機能低下をともなう非虚血心筋症に対する ICD 適応	心機能低下をともなう非虚血性心筋症に対する ICD 適応
p33 図 6 タイトル	心機能低下をともなう非虚血心筋症に対する ICD の適応	原因不明の失神に対する ICD の適応
p37 図 7「ブルガダ症候群に対する ICD の適応」有症候性の右下 2 つめ	電気生理検査（2 連期外刺激以下）での VF 誘発	電気生理検査（2 連期外刺激以下）での VF 誘発あり
p37 図 7「ブルガダ症候群に対する ICD の適応」有症候性の右下 2 つめ、「電気生理検査（2 連期外刺激以下）での VF 誘発あり」の分岐	ありの場合：クラス IIa なしの場合：クラス IIb	あり，なしの分岐を削除，すべてクラス IIa へ
p37 図 7「ブルガダ症候群に対する ICD の適応」一番上，「タイプ 1 ブルガダ心電図（自然発生あるいは Na チャネル遮断薬誘発）」の右下 1 つめ	無症候性	無症候性（自然発生ブルガダ心電図）*2 *2：Na チャネル遮断薬誘発性の場合は慎重な経過観察
P47 表 35「ペースメーカー/ICD の適応があるもしくは植込み後の患者に対する CRT 適応の推奨とエビデンスレベル」各心機能分類の②（3 箇所あり）	LVEF < 50%	LVEF ≤ 50%

P60 表 49「アブレーションを行ううえで推奨される経験数」 「本ガイドライン」の「臨床心臓電気生理検査（人）」	—	150
P65 左段本文下から 14~15 行目	0.03~0.11%と低いものの、致死率は 70~80%と高い、 ^{580, 583)} 。	<u>0.02</u> ~0.11%と低いものの、致死率は 70~80%と高い、 ^{<u>578</u>, 580, 583)} 。
p88 右段本文上から 9 行目, 18 行目	ExTra mapping	ExTRa Mapping